Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 954821 del 23/11/2026

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Servizi Sanitari

Ai Direttori Generali e ai Commissari Straordinari delle AA.SS.PP. e delle AA.OO. del S.S.R.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Ai Direttori delle Farmacie Territoriali e delle Farmacie Ospedaliere

Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

A Federfarma Calabria

e, p.c. **Al Presidente della Regione Calabria**

Oggetto: Integrazione alla Circolare regionale prot. n. 796810 del 30/09/2026 – Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027. Indicazioni operative sull'utilizzo dei vaccini antinfluenzali disponibili.

Facendo seguito alla Circolare regionale richiamata in oggetto, relativa alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni operative in merito all'impiego delle diverse tipologie di vaccino antinfluenzale, al fine di garantire la continuità dell'offerta vaccinale sull'intero territorio regionale.

In particolare, si precisa che, in caso di temporanea indisponibilità del vaccino antinfluenzale trivalente inattivato (VIT), è possibile ricorrere all'utilizzo di altre formulazioni vaccinali antinfluenzali disponibili, purché autorizzate per la fascia di età del soggetto destinatario e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e delle raccomandazioni ministeriali vigenti, facendo riferimento alla tabella riepilogativa ministeriale allegata alla presente e comunque parte integrante e sostanziale della suddetta circolare regionale per la campagna antinfluenzale 2026/2027.

Restano ferme le specifiche indicazioni di impiego previste per i vaccini antinfluenzali potenziati, distinti nelle seguenti tipologie:

- VITa – Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato: indicato per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni;

- VIThd – Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato ad alto dosaggio: indicato per i soggetti di età pari o superiore a 60 anni.

Si precisa, altresì, che anche nell'ambito del completamento del ciclo vaccinale antinfluenzale pediatrico, nei bambini per i quali è prevista la somministrazione di una seconda dose, è possibile utilizzare un vaccino antinfluenzale diverso da quello impiegato per la prima dose, ricorrendo alle formulazioni disponibili, purché autorizzate per fascia di età e nel rispetto delle indicazioni contenute nei rispettivi RCP e delle raccomandazioni ministeriali vigenti, fermo restando il rispetto dell'intervallo minimo previsto tra le due somministrazioni.

Le presenti indicazioni sono finalizzate a garantire la continuità delle attività vaccinali, evitando eventuali rallentamenti dovuti alla temporanea indisponibilità di specifiche formulazioni e favorendo l'utilizzo appropriato delle dosi disponibili.

Si invitano le Aziende Sanitarie Provinciali a garantire la massima diffusione delle presenti indicazioni a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella campagna vaccinale.

Le indicazioni operative contenute nella presente nota sono state illustrate dal Coordinatore Scientifico e condivise nell'ambito della riunione della Cabina di Regia per il governo e l'attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, di cui al DDG n. 13158 del 19/09/2024 e s.m.i., tenutasi in data 16 novembre 2026, come riportato nel relativo verbale, prot. n. 953134 del 23/11/2026, a seguito dell'esame delle criticità emerse in relazione alla disponibilità dei vaccini antinfluenzali sul territorio regionale e della valutazione delle possibili soluzioni operative, nel rispetto delle raccomandazioni ministeriali vigenti.

Cordiali saluti,

Il Dirigente Settore n. 4
Dott. Francesco Lucia
FRANCESCO
LUCIA
23.11.2026
12:26:27
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
Dott. Ernesto Esposito
ERNESTO
ESPOSITO
23.11.2026
15:32:26
GMT+01:00

Tabella 1. Tipologie di vaccino, modalità di somministrazione dosi per fascia di età secondo RCP (*)

Codice	Vaccino	Descrizione	Dosi e modalità di somministrazione
VIT	Vaccino inattivato trivalente, o sub-unità, o split	I vaccini antinfluenzali inattivati attualmente autorizzati per l'uso in Italia sono vaccini split e a subunità. I vaccini influenzali inattivati possono essere impiegati in tutte le fasi della gravidanza. Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinfluenzali trivalenti (VIT) che contengono 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e 1 virus di tipo B. Se non altrimenti specificato (vedi sotto), i vaccini inattivati sono prodotti con virus replicato in uova embrionate di pollo.	6 mesi – 9 anni: 2 dosi (0,50 ml), ripetute a distanza di almeno 4 settimane ai bambini vaccinati per la prima volta; 1 dose (0,50 ml) se già vaccinati negli anni precedenti. ≥10 anni: 1 dose (0,50 ml)
LAIV	Vaccino vivo attenuato	Il vaccino LAIV trivalente è un vaccino antinfluenzale vivo attenuato somministrato con spray intranasale e autorizzato per l'uso in persone di età compresa tra 2 e 18 anni. I ceppi influenzali contenuti nel vaccino sono attenuati in modo da non causare influenza.	2 anni – 9 anni: 2 dosi (0,2 ml) ripetute a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta; 1 dose (0,2 ml) se già vaccinati negli anni precedenti. 10-17 anni: 1 dose (0,2 ml)
VITcc	Vaccino inattivato trivalente su colture cellulari	Il vaccino VITcc è un vaccino antinfluenzale trivalente che contiene 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e 1 virus di tipo B cresciuti su colture cellulari, ed è autorizzato per l'uso in bambini e adulti di età superiore ai 6 mesi di età.	6 mesi – 9 anni: 2 dosi (0,50 ml), ripetute a distanza di almeno 4 settimane ai bambini vaccinati per la prima volta; 1 dose (0,50 ml) se già vaccinati negli anni precedenti. ≥10 anni: 1 dose (0,50 ml)
VITr	Vaccino trivalente a DNA ricombinante	Il vaccino trivalente ricombinante è prodotto tramite la tecnologia del DNA ricombinante che si basa sulla produzione di una proteina da un agente infettivo senza utilizzare il microrganismo selvaggio, mediante tecniche di ingegneria genetica che frammentano il DNA corrispondente e lo esprimono in diversi vettori di espressione "in vitro". È indicato dai 18 anni di età.	≥18 anni: 1 dose (0,50 ml)
VITa	Vaccino inattivato trivalente adiuvato	Uno dei vaccini trivalenti inattivati contiene l'adiuvante MF59, un'emulsione olio-in-acqua composta da squalene come fase oleosa. L'adiuvante ha lo scopo di potenziare e ampliare la risposta immunitaria antigene-specifica e a prolungare la durata della risposta immunitaria. Gli altri prodotti inattivati non contengono un adiuvante. È indicato nelle persone di età pari o superiore a 50 anni.	≥50 anni: 1 dose (0,50 ml)
VIThd	Vaccino inattivato trivalente ad alto dosaggio	Il vaccino ad alto dosaggio è un vaccino split trivalente che contiene due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B contenente 60 mcg di emoagglutinina (HA) per ciascun ceppo virale per garantire una maggiore risposta immunitaria e quindi una maggiore efficacia. È indicato nelle persone di età pari o superiore a 60 anni.	≥60 anni: 1 dose (0,50 ml)